

Нашим собакам сейчас очень легко подцепить глистов, ведь снег растаял и из-под сугробов вылезла гадость, которая копилась полгода

СОВЕТЫ ДОКТОРА Виктория КУДРИНА, главный врач ветеринарной клиники**«Альбетта»:**

- Гнать глистов необходимо и кошкам, и собакам - примерно раз в квартал, независимо от времени года. Даже если питомец не гуляет, ему нужно проводить профилактику хотя бы раз в полгода - ведь он облизывает свои лапки, которые далеко не стерильны! Давать лекарство лучше с утра, предварительно взвесив животное, чтобы доза препарата была точной. И не забудьте прогнать глистов за 10 дней до того, как поведете его на очередную прививку! Название Дронтал Плюс. Цена - 345 руб. (6 таблеток) Азинокс плюс. Цена - 42 руб. (6 таблеток) Цестал Плюс. Цена - 315 руб. (10 таблеток) Празител. Цена - 32 руб. (6 таблеток) Поливеркан. Цена - 200 руб. (8 кубиков) Состав Пирантел, празиквантел, фебантел. Празиквантел и тетрализол гидрохлорид. Пирантел, фебендазол, празиквантел. Пирантел, фебендазол, празиквантел. Оксбендазол, никлозамид. Как применять Доза - 1 таблетка на 10 кг массы. Диеты и применения слабительных средств не требуется. Для профилактики надо пить таблетки каждые 4 месяца, а также перед вакцинацией, перед вязкой и за 10 дней до щенения. 1 таблетка на 10 кг массы тела, дают утром вместе с кормом. Голодной диеты и применения слабительных средств не требуется. Для профилактики повторять каждые 2 месяца в той же дозе. 1 таблетка на 10 кг массы тела собаки. Для профилактики пьют препарат каждые 3 месяца. Предварительная диета не требуется, можно давать щенкам и беременным сукам. 1 таблетка на 10 кг массы, дают в утреннее кормление с небольшим количеством корма. Предварительной голодной диеты не требуется. Для профилактики празител пьют 1 раз в 3 месяца. Кормящим сукам препарат назначают через 2 - 3 недели после родов. 1 сахарный кубик на 10 кг массы. Для профилактики пьют препарат каждые 3 месяца, а также перед вакцинацией, перед вязкой, за 2 недели до родов и через две - после родов. Предварительная диета не требуется. Противопоказания Нет. Не давать беременным и кормящим сукам (в течение 10 дней после родов). Нет. Нельзя давать беременным сукам. Нет.