

*В целом, **ирландские сеттеры** - здоровые собаки, доживающие обычно до 13-14 лет. Однако, они склонны к некоторым заболеваниям.*

Эпилепсия. У ирландских сеттеров встречается эпилепсия. Покупая щенка, необходимо поинтересоваться у заводчика, наблюдались ли случаи заболевания в роду.



Ирландский сеттер. Интернет-магазин Pet-Gifts.RU. Авто фото Пётр Котоводов

Синдром острого расширения желудка. Болезнь также часто называют заворот желудка, или вздутие. Эта болезнь поражает ирландских сеттеров чаще, чем других собак. У заболевшей собаки желудок перекручивается и вздувается, передавливая главные вены в брюшной полости, сопровождается дыхательной и сердечнососудистой недостаточностью. Следует заметить, что СРЖ у ирландских сеттеров иногда

сопровождается классическими симптомами, такими как вздутие брюшной полости и позывы к рвоте, но часто бывает, что эти симптомы не наблюдаются, по крайней мере, на ранних стадиях СРЖ.

Беспокойное поведение собаки часто бывает единственным видимым симптомом. Если вы подозреваете у собаки СРЖ, ее следует немедленно показать ветеринару, и не стесняйтесь настаивать на рентгенографическом обследовании. Кроме того, поскольку традиционные домашние средства (например, удаление газа, с помощью проколов кожи иглой от шприца или ввода в желудок трубки) в случаях СРЖ не приводят к должному результату. Не тратьте драгоценное время, а сразу обращайтесь к ветеринару.

Чтобы уменьшить вероятность заболевания, владельцам ирландских сеттеров следует предпринять следующие меры предосторожности.

1. Лучше кормите собаку дважды в день понемногу, чем один раз и много.
2. Перед кормлением размачивайте сухой корм.
3. Не давайте собаке сильных физических нагрузок в течение одного часа до кормления и двух часов после.
4. Поставьте миску с едой на возвышение.
5. Используйте только высококачественные корма, не содержащие соевых добавок.

Это заболевание может быстро привести к смерти собаки, но если вовремя провести хирургическую операцию, которая называется гастропексия (подшивание желудка к брюшной стенке), то можно не только спасти жизнь животному, но также существенно снизить возможность повторного заболевания СРЖ.

Дисплазия тазобедренных суставов. Также достаточно часто встречается у ирландских сеттеров. В двухлетнем возрасте, до вязки, все щенки, предназначенные к разведению, должны пройти рентгенографическое исследование.

Гипотиреоз. Это заболевание достаточно часто встречается у ирландских сеттеров. Для диагностирования заболевания необходимо провести исследование щитовидной железы.

Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA). Раньше прогрессирующая атрофия сетчатки (форма наследственной слепоты) была для ирландских сеттеров серьезной проблемой. В настоящее время тест DNA позволяет выявить потенциальных носителей

PRA. Ген болезни рецессивный, и болезни можно избежать, если скрещивать собак, не являющихся носителями заболевания. У ирландских сеттеров болезнь начинает развиваться в раннем возрасте.

Гипертрофическая остео дистрофия. Заболевание поражает щенков ирландского сеттера в возрасте, как правило, 4-8 месяцев, и иногда заканчивается смертью животного. Симптомы включают в себя жар, вялость, опухание суставов, хромоту. Немногие ветеринары смогут правильно диагностировать и лечить это заболевание, так что важно, чтобы хозяева щенка знали о существовании такой болезни. В ее развитии не последнюю роль играет чрезмерное количество пищевых добавок и высокий уровень протеина в корме щенка.

Спондилез. У ирландских сеттеров старшего возраста часто развивается спондилез - поражение позвоночника, которое снижает подвижность собаки. Болезнь хорошо поддается лечению адекваном или его оральными формами - козеквином и гликофлексом, также помогает акупунктура.

Портал Зооклуб

При перепечатке данной статьи активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА, в противном случае, использование статьи будет рассматриваться как нарушение "Закона об авторских и смежных правах".